

Checklist logopedie voor kinderen van 0 - 4 jaar

Wanneer één of meer van onderstaande stellingen van toepassing is op uw kind is het verstandig contact op te nemen met een logopedist.

Eten en drinken

- problemen met het drinken uit de borst of de fles(baby)
- moeite met de overgang naar vaster voedsel(baby)
- veel kokhalzen of spugen
- vaak verslikken

Gehoor

- reageert niet goed op geluid
- heeft regelmatig oorontstekingen
- spreekt luid

Taal

- imiteert geen handelingen of gebaren (denk aan iets geven of zwaaien)
- gebruikt geen gebaren of gezichtsuitdrukkingen (denk aan wijzen of boos kijken)
- maakt geen of weinig oogcontact
- neemt geen deel aan interactie of beurtwisseling
- reageert niet op eigen naam
- lijkt eenvoudige taal niet te begrijpen
- raakt gefrustreerd bij niet begrepen worden
- brabbelt niet (0-1 jaar)
- zegt nog geen woordjes (1-2 jaar)
- spreekt nog niet in korte zinnen (2-4 jaar)
- raakt gefrustreerd bij het zich niet verstaanbaar kunnen maken

Afwijkende mondgewoonten

- heeft meestal de mond open
- heeft veel speekselverlies
- zuigt nog op speen, duim of anders (3 jaar)
- klinkt verkouden

Adem en Stem

- kucht en hoest veel
- de stem klinkt schor of hees
- de stem heeft te weinig volume

Articulatie

- is slecht verstaanbaar (vanaf 2 jaar)
- spreekt veel medeklinkers niet uit (3-4 jaar)
- spreekt niet vloeiend (stotteren of haperen)
- slist (tong tussen de tanden tijdens het spreken)

Overig

- ontwikkelt zich anders dan leeftijdgenoten
- leeft in eigen wereld
- heeft sterke afweer van zintuiglijke prikkels

Let op: deze checklist filtert niet elk logopedisch probleem. Als u na het lezen van de checklist nog vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind kunt u het beste contact opnemen met een logopedist bij u in de buurt. U kunt ook uw huisarts raadplegen.